



## PRVI PREGLED

Pred prvim testiranjem se pacienta seznanijo z namenom in načinom testiranja na psihoaktivne substance (PAS).

Pridobi se pacientov pristavek. Izpolni se kartonček za opravljanje testiranja.

Test na več PAS  
po navodilu zdravnika

## IZVAJALEC/OPOMBE

Zdravnik

Zdravstveni tehnik/med.sestra ali laborant z dodatnimi znanji

## AMBULANTNA OBRAVNAVA, PODPORNNA DNEVNA BOLNICA, DNEVNA BOLNICA ZA BOLNIKE S KOMORBIDNOSTJO

Ob vsakem ambulantnem pregledu se izpolni kartonček za opravljanje testiranja.

V kolikor pacient dokazuje abstinenco: test na več PAS enkrat tedensko za PAS z daljšo razpolovno dobo, dvakrat tedensko za PAS s krajšo razpolovno dobo  
V kolikor pacient ne abstiniira: Veljajo navodila za prvi pregled

Test na več PAS  
po navodilu terapevta

Individualni/skupinski terapevt

Priporočila o pogostosti testiranja veljajo tudi za paciente v programih podporne dnevne bolnice, dnevne bolnice za paciente s komorbidnostjo in se lahko uporabljajo tudi v drugih programih zdravljenja/obravnave uživalcev drog

## SPREJEM V BOLNIŠNICO

Test na več PAS

Sprejemni zdravnik

## NA ODDELKU ZA DETOKSIKACIJO (DTO)

Člani terapevtskega tima

Po izhodih (TSPAS takoj po vnitvi na oddelek in/ali TUPAS naslednji dan) in individualni presoji test na več PAS ali ciljano  
Lahko tudi ob prehodu na OIPZ

## NA ODDELKU ZA INTENZIVNO PODALJŠANO ZDRAVLJENJE (OIPZ)

Člani terapevtskega tima

Po izhodih (TSPAS takoj po vnitvi na oddelek in/ali TUPAS naslednji dan) in individualni presoji test na več PAS ali ciljano

## V PROGRAMU DNEVNE BOLNIŠNICE ZA ABSTINENTE

Člani terapevtskega tima

Test na več PAS enkrat tedensko za PAS z daljšo razpolovno dobo,  
dvakrat tedensko za PAS s krajšo razpolovno dobo

Test na več PAS lahko le ciljano

Vedno se lahko po presoji terapevta opravi le ciljane in se pacientu pove pri sporočanju rezultata, kateri testi so bili oz. niso bili opravljeni.

Kadar opravljamo tudi teste na slino, se moramo zavedati, da so ti lahko pozitivni bistveno krajši čas kot urinski testi, da torej ne nadomeščajo urinskih testov, da pa je lahko rezultat pozitiven hitreje po uporabi različnih PAS.

Vedno po presoji terapevta lahko opravimo tudi test na vsebnost alkohola v izdihanem zraku.

Kadar že pridobimo pacientovo soglasje za opravljanje testiranj in naknadno test odkloni, se smatra, da je oseba uporabila PAS- seveda mora biti tudi o tej posledici odklonitve testa predhodno seznanjena in se s tem strinjati.

Kadar teste uporabljamo pri svojcih, ki sodelujejo v terapevtskih programih, jih ravno tako seznanimo z namenom in načinom izvajanja testa ter jih zaprosimo za njihovo privolitev.